



COLTURE ARBOREE



Vigneto biologico (www.rusticitoscani.com)

VITE		INDICAZIONE TECNICHE			
Fase fenologica	Parassita	Principio attivo	Dose per HI	Organismi utili	Consigli tecnico agronomici
Da foglie distese a fioritura	Oidio	zolfo	vedi etichetta	<i>Ampelomyces quisqualis</i> (da non alternare con lo zolfo)	Intervenire con potature verdi arieggiando i grappoli. Pianificare le concimazioni e le irrigazioni per evitare un eccessivo vigore vegetativo.
	Peronospora	prodotti rameici	vedi etichetta		Impiantare varietà meno suscettibili, limitare le concimazioni azotate, evitare abbondanti irrigazioni. Limitare quanto più possibile i trattamenti con rame.
	Tignoletta	<i>Bacillus thuringiensis</i> disorientamento	150 cc		Eseguire potatura verde cercando di esporre i grappoli al sole. Installare trappole a feromoni per individuare il momento migliore per il trattamento.

	Tripide	piretro naturale rotenone	100 cc 250-300 cc	<i>Orius laevigatus</i>	Monitorare precocemente la presenza del tripide sulla flora spontanea con trappole cromotropiche di colore azzurro. Se l'insetto presente intervenire in pre fioritura.
Da allegazione a raccolta	Oidio	zolfo	vedi etichetta 30-50 gr	<i>Ampelomyces quisqualis</i>	
	Peronospora	prodotti rameici	vedi etichetta		
	Tignoletta	<i>Bacillus thuringiensis</i> disorientamento	150 cc		La terza generazione è quella più pericolosa, intervenire al superamento della soglia (5% dei grappoli colpiti).
	Muffa grigia	bicarbonato di sodio zolfo + bentonite	600 gr vedi etichetta vedi etichetta	<i>Trichoderma harzianum</i>	Adottare piani di concimazioni e di irrigazione equilibrati; eseguire potature verdi e prestare cura nel sistemare i tralci, liberare i grappoli dalle foglie; efficace protezione da oidio, tignoletta e tripidi. Utilizzare coperture con rete in plastica per limitare i danni meccanici.
	Mal dell'esca				In tarda estate segnalare le piante che mostrano sintomi asportare il legno cariato sino al legno sano; estirpare le piante che mostrano sintomi di carie o imbrunimenti in prossimità del punto di innesto Disinfettare i grossi tagli durante la potatura con mastici Evitare la trinciatura e l'interramento dei sarmenti, portarli fuori dal campo e bruciarli.

N.B. Tutti i principi attivi impiegati per la difesa fitosanitaria devono rispettare la normativa vigente! vedi pag. 11