

OLIVO		INDICAZIONI TECNICHE			
Fase fenologica	Parassita	Principio attivo	Dose per hl	Organismi utili	Consigli tecnico agronomici
Riposo vegetativo	Rogna	prodotti rameici polliglia bordolese (spennellare il tronco fino all'impalcatura)	vedi etichetta		Durante le operazioni di potatura eliminare i rami colpiti. Disinfettare i tagli asportare e bruciare i residui di potatura.
	Crittogame				
Ripresa vegetativa	Oziorrinco				Collocare intorno al tronco dei manicotti di lana artificiale ad imbuto per impedire la salita degli adulti.
	Occhio di pavone	prodotti rameici caolino	vedi etichetta		Mantenere una buona aerazione della chioma, evitare zone umide. effettuare una diagnosi precoce
	Fumaggine	prodotti rameici	vedi etichetta		Lotta indiretta mediante il controllo degli insetti che producono melata.
	Margaronia	<i>Bacillus thuringiensis</i>	150 cc		Intervenire solo in presenza di larve e nelle fasi iniziali dell'infestazione.
Allegagione	Tignola	<i>Bacillus thuringiensis</i>	150 cc		Intervenire solo se vengono interessate vaste superfici o interi comprensori.
	Cocciniglia	olio bianco	1000 cc	<i>Scutellista cyanea</i>	In caso di elevata e diffusa presenza effettuare due interventi: - quando le femmine ovigere hanno l'80% delle uova schiuse; - quando si è completata la schiusura di tutte le uova e fuoriuscita delle neanidi.
Da frutto ingrossato a invaiatura	Mosca dell'olivo	cattura massale rotenone	250-300 cc	<i>Opius concolor</i>	Cattura massale con trappole (alimentari, cromotropiche e sessuali) poste sulle piante in posizione sud-est Anticipare la raccolta
		piretro naturale	100 cc	<i>Beauveria bassiana</i>	
		polisolfuro di calcio silicato di sodio	bassi dosaggi vedi etichetta		

N.B. Tutti i principi attivi impiegati per la difesa fitosanitaria devono rispettare la normativa vigente! vedi pag. 11