

AGRUMI		INDICAZIONI TECNICHE			
Fase fenologica	Parassita	Principio attivo	Dose per hl	Organismi utili	Consigli tecnico agronomici
Riposo vegetativo	Cocciniglie Ragno rosso Nuovo ragno rosso Dialeurode	olio bianco polisolfuro di calcio	2000 cc 10 kg		Intervenire contro le forme svernanti
	Mal secco	poltiglia bordolese	vedi etichetta		Si consiglia di proteggere le piante dalle avversità meteoriche e di asportare i rami infetti.
	Batteriosi	prodotti rameici	vedi etichetta		Si consiglia di adottare idonee misure (frangivento, evitare ristagni idrici, concimazione equilibrata) di difesa dalle avversità meteoriche
Prefioritura	Afidi	olio bianco e piretro naturale rotenone gelatina (Vedi N.B.)	1000 cc 100 cc 250-300 cc vedi etichetta	<i>Crysoperla carnea</i> <i>Aphidius colemani</i> <i>Harmonia spp.</i> <i>Lysiphebus testaceipes</i>	Diffondere o favorire l'azione di predatori e parassitoidi naturali.  Controllare le formiche tramite fasce di colla per impedire la risalita ed evitare la diffusione del fitofago
	Gommosi del colletto	spennellature al tronco con poltiglia bordolese	fino a 6 kg/hl		Evitare eccessi di umidità al tronco, sconcare le piante e dosare gli interventi irrigui.
Ingrossamento frutti	Cotonello	olio bianco proteinato di zolfo	1500 cc	<i>Leptomastrix dactylopi</i> <i>Cryptolaemus montrouzieri</i>	Controllare le formiche
	Mezzo grano di pepe	olio bianco polisolfuro di calcio  proteinato di zolfo	1500 cc  5-6 kg vedi etichetta	<i>Metaphicus scutellista cyanea</i>	Diffondere predatori o parassitoidi naturali. Effettuare interventi di potatura per favorire
	Cocciniglia rossa forte	olio bianco polisolfuro di calcio proteinato di zolfo gelatina (Vedi N.B.)	1500 cc 5-6 kg vedi etichetta	<i>Aphytis melinus</i>	l'arieggiamento e illuminazione della chioma.
	Minatrice serpentina	olio bianco e azadiractina (ripetere l'intervento tre volte) rotenone piretro naturale	500 cc 150 cc  vedi etichetta vedi etichetta	<i>Cirrospilus pictus</i>	Evitare trattamenti negli impianti adulti, ridurre gli apporti di azoto, evitare eccessi idrici. Su giovani impianti o reinnesti porre reti antinsetto a cuffia. copertura con tessuto non tessuto su impianti giovani

	Aleurodidi	olio bianco sapone vegetale molle	1500 cc 800 - 1000 cc	<i>Cales noaki</i>	spollonatura estiva
	Felola	rotenone piretro naturale azadiractina	250-300 cc 100 cc 150 cc		Interventi in autunno contro le cocciglie con polissolfuro di calcio al 5% hanno effetto repellente nei confronti di questo fitofago.
	Fumaggine	prodotti rameici	vedi etichetta		Lotta indiretta mediante il controllo degli insetti che producono melata.
	Ragnetto rosso	olio bianco proteinato di zolfo zolfo	1500 cc 1,5 kg vedi etichetta		Contenimento del fitofago con nemici naturali.
Invaliatura	Allupatura	prodotti rameici	vedi etichetta		Mantenimento inerbimento invernale.
	Mosca della frutta	piretro naturale rotenone azadiractina cattura massale caolino (Vedi N.B.)	100 cc 120-300 cc 150 cc vedi etichetta	<i>Beauveria bassiana</i>	Cattura massale con trappole alimentari poste una ogni 9-10 piante in posizione sud-est a partire da giugno-luglio.

*N.B. Tutti i principi attivi impiegati per la difesa fitosanitaria devono rispettare la normativa vigente! vedi pag. 11*



*Lancio di insetti utili*



*Leptomastix d. in azione su Planococcus c.*



*Esiti della parassitizzazione sul Planococcus c.*