

PEPERONE		INDICAZIONI TECNICHE			
Fase fenologica	Parassita	Principio attivo	Dose per hl	Organismi utili	Consigli tecnico Agronomici
Trapianto	Cancrena pedale Batteriosi	prodotti rameici	vedi etichetta		Utilizzare piantine sane; ampie rotazioni; cultivar e portainnesti resistenti.
Da pre-fioritura a raccolta	Afidi	piretro rotenone	80-100 cc 250-300	<i>Aphidius colemani</i> e/o altri ausiliari	Iniziare i lanci alla comparsa delle prime colonie in ragione di circa 10 individui per mq. Creare aree con vegetazione spontanea. Controllare le formiche. Ove possibile, proteggere la coltura con reti antinsetto.
	Ragnetto rosso	olio bianco estivo	1000 cc 80-120 cc	<i>Phytoseiulus persimilis</i> <i>Beauveria bassiana</i>	Effettuare i lanci di fitoseidi alla presenza dei primi ragnetti in ragione di 4-6 individui per mq.
	Tripidi	azadiractina	80-120 cc 75-150 cc	<i>Orius laevigatus</i> <i>Beauveria bassiana</i>	Monitorare la presenza con trappole cromotropiche azzurre. Alla presenza effettuare lanci in ragione di 2-4 individui per mq.
	Lepidotteri	<i>Bacillus thuringiensis</i>	150 cc		Effettuare un accurato monitoraggio con trappole a feromoni. Intervenire contro le larve giovani eventualmente ripetere dopo una settimana. Effettuare ampie rotazioni.
	Aleurodidi	azadiractina sapone di potassio	75-150 cc 300-800 cc 80-120 cc	<i>Macrolophus caliginosus</i> <i>Beauveria bassiana</i>	Effettuare i lanci all'inizio delle infestazioni, 1-2 predatori per mq.
	Mal bianco	zolfo bicarbonato di sodio	vedi etichetta 400 gr 5-7 gr	<i>Ampelomyces quisqualis</i>	Intervenire precocemente alla comparsa dei primi sintomi; impiegare cultivar resistenti; arieggiare i tunnel.

*N.B. Tutti i principi attivi impiegati per la difesa fitosanitaria devono rispettare la normativa vigente! vedi pag. 11*