




**Agenzia  
Lucana di  
Sviluppo e  
Innovazione in  
Agricoltura**

# NOTIZIARIO DI AGRICOLTURA INTEGRATA



**Azienda Agricola  
Sperimentale  
Dimostrativa  
"BOSCO GALDO"**

Numero 9  
del 9 maggio 2013



via Grumentina  
85050 Villa d'Agri (Pz)  
tel: 0835 244 602  
0835 244 606  
0835 244 608  
e-mail:  
[camilla.nigro@alsia.it](mailto:camilla.nigro@alsia.it)  
[mario.campana@alsia.it](mailto:mario.campana@alsia.it)  
[francesco.pisani@alsia.it](mailto:francesco.pisani@alsia.it)



Il bollettino è disponibile anche  
sul portale dei Servizi  
di Sviluppo Agricolo  
[www.ssabasilicata.it](http://www.ssabasilicata.it)



## MELO: ingrossamento frutti



**Ticchiolatura** (*Venturia inaequalis*): voli in esaurimento. Si consiglia di intervenire preventivamente, in previsione di pioggia, con *ditianon*, *fluazinam* o, subito dopo la pioggia, con *ciprodinil* o *pirimetanil*. In caso di vegetazione non protetta, è necessario intervenire con propineb, metiram, ditianon o fluazinam entro 24 dalla pioggia infettante o entro 72 ore con difenoconazolo, tebuconazolo (IBE). In presenza di sintomi intervenire con IBE (difenoconazolo, tebuconazolo) in miscela con prodotti di copertura.

**Carpocapsa** (*Cydia pomonella*): elevate catture in tutte le aziende-pilota. Secondo il modello previsionale c'è una presenza del 10% di uova e del 61% di adulti con un anticipo di alcuni giorni rispetto allo scorso anno. Al superamento della soglia di catture (1-2 adulti/trappola/settimana) chi non è intervenuto con ovicidi, è necessario che intervenga con clorantraniliprole.



## PERO: ingrossamento frutti



**Ticchiolatura** (*Venturia pirina*): in previsione di piogge, intervenire preventivamente con *dithianon*, *dodina*. In presenza di sintomi o con vegetazione non protetta, intervenire con IBE (difenoconazolo, tebuconazolo) in miscela con prodotti di copertura.

**Carpocapsa** (*Cydia pomonella*): vedi melo.

## VITE: grappoli separati-bottoni fiorali separati



**Oidio** (*Uncinula necator*): intervenire preventivamente o subito dopo la pioggia con zolfo.

**Peronospora** (*Plasmopara viticola*): intervenire preventivamente in previsione di piogge, con rameici, metiram, propineb, mancozeb, fosetil-Al o dithianon.

## OLIVO: mignolatura



**Nessun trattamento.**